

分類 E-2-⑧

製剤名	生理食塩点眼液 せいりしょくえんてんがん 読み えき
規格・単位	5mL/本
効能・効果	人工涙液
処方	注射用生理食塩液 100・250・500mL
必要な器具	
調製法	注射用生理食塩液より、0.45 μ mフィルターを通して点眼容器に5mLずつ、ろ過分注する。
調製上の注意点	クリーンベンチ内で分注する。
用法・用量 使用方法など	
容器・貯法など	冷所保存
有効期限	6ヶ月
使用診療科(主要)	眼科
供給方法	備品、オーダー(処置、処方)
製剤依頼書の有無	
備考	
参考文献	

分類	E-2-⑧
----	-------

製剤名	0.5%アトロピン点眼液 <small>読み あとろびんてんがんえき</small>
規格・単位	5mL/本
効能・効果	診断または治療を目的とする散瞳
処方	1%アトロピン点眼液(製品) 注射用生理食塩液を 1:1で混合
必要な器具	注射筒 5mL点眼容器
調製法	注射筒内で1%アトロピン点眼液と注射用生理食塩液を1:1で混合し、0.45 μ mフィルターを通して点眼容器(赤キャップ)に5mLずつ、ろ過分注する。
調製上の注意点	クリーンベンチ内で分注する。
用法・用量 使用方法など	
容器・貯法など	冷所保存
有効期限	(5mL)6カ月
使用診療科(主要)	眼科
供給方法	オーダー(処置、処方)
製剤依頼書の有無	
備考	
参考文献	

分類	E-Z-⑧
----	-------

製剤名	5%塩化ナトリウム点眼液 <small>えんかなとりうむてんが 読み んえき</small>
規格・単位	5ml/本
効能・効果	角膜浮腫
処方	8本分 10%塩化ナトリウム注 20ml 注射用水 20ml
必要な器具	点眼容器(藤色キャップ、5mL容器)
調製法	8本分)50mL注射筒内で10%塩化ナトリウム注を注射用水で1:1に希釈して、0.45 μ mフィルターを通して点眼容器に5mLずつ、ろ過分注する。
調製上の注意点	クリーンベンチ内で作業
用法・用量 使用方法など	
容器・貯法など	冷所保存
有効期限	6ヶ月
使用診療科(主要)	眼科
供給方法	オーダー(処置、処方)
製剤依頼書の有無	
備考	
参考文献	病院薬局製剤第3版 P119

分類 G-1-④

製剤名	テイネイ水(耳垢水) 読み ていねいすい
規格・単位	10mL/本
効能・効果	耳垢栓塞の軟化
処方	10本分として (局)炭酸水素ナトリウム 5g (局)グリセリン 25mL 蒸留水 全量100mL
必要な器具	
調製法	滅菌コルベンを蒸留水で3回注ぐ。炭酸水素ナトリウムを蒸留水で溶かす。溶けにくい時は超音波洗浄機を使用して溶解する。グリセリンを加え、蒸留水で全量100mLとし、よく混ぜる。安全キャビネット内で10mLずつ点眼容器に分注する。
調製上の注意点	フィルターは通さなくてよい。
用法・用量 使用方法など	1日1～2回、点耳
容器・貯法など	10mL点眼容器、室温保存
有効期限	6ヶ月
使用診療科(主要)	耳鼻科
供給方法	オーダー(処置、処方)
製剤依頼書の有無	
備考	
参考文献	

分類 G-1-④

製剤名	ハールワッサー (Haar Wasser) 読み はーるわっさー
規格・単位	
効能・効果	頭部乾性脂漏、養毛剤
処方	レゾルシン 25g 蒸留水 250mL (局)加香ヒマシ油 25mL ベルガモット油 15滴 (局)エタノール 250mL (局)グリセリン 25mL (全量約550mL) 変色を予防するためアスコルビン酸を0.5%添加
必要な器具	
調製法	加香ヒマシ油25mLを秤り取り、95%エタノール250mLを加え、ベルガモット油15滴を加える。 別に、レゾルシン25gを蒸留水250mLに溶解する。 両者を混合し、最後にグリセリン25mLを加える。 アスコルビン酸を0.5% (1Lに対し5g→550mLに2.75g)加える。
調製上の注意点	
用法・用量 使用方法など	塗擦
容器・貯法など	遮光・冷所保存
有効期限	1年
使用診療科(主要)	
供給方法	オーダー(処置、処方)
製剤依頼書の有無	
備考	レゾルシンは光、空気です桃色→紅色→褐色になるが、アスコルビン酸を0.5～1%加えることで防ぐことができる。
参考文献	

分類 G-1-④

製剤名	1%・5%・10% ホルマリンアルコール <small>読み ほるまりんあるこーる</small>
規格・単位	500mL/本
効能・効果	
処方	(劇)ホルマリン 【1%】5mL 【5%】25mL 【10%】50mL 95%エタノール 全量500mL
必要な器具	
調製法	各濃度の液を調製し、褐色ポリ瓶に500mLずつ分注する。
調製上の注意点	
用法・用量 使用方法など	
容器・貯法など	褐色ポリ瓶(外来などで小分け時ポリ容器可)、室温保存
有効期限	6ヶ月
使用診療科(主要)	
供給方法	【1%】オーダー(処置、処方)、【5%】【10%】手書き処方箋
製剤依頼書の有無	
備考	
参考文献	

分類 G-1-④

製剤名	止痒水K 読み しょうすい
規格・単位	500mL/本
効能・効果	透析患者の止痒
処方	①(局)95%エタノール 240ml ②(局)液状フェノール 3.5ml ③(局)ハッカ油 2.5ml ④(局)グリセリン 15ml 蒸留水 全量 500mL
必要な器具	
調製法	95%エタノール、液状フェノール、ハッカ油、グリセリンの順に加え、1つ入れるごとに良く攪拌する。 蒸留水で全量に合わせ、よく混合する。
調製上の注意点	
用法・用量 使用方法など	塗布
容器・貯法など	室温保存、褐色ポリ容器
有効期限	6ヶ月
使用診療科(主要)	
供給方法	オーダー(処置、処方)
製剤依頼書の有無	有
備考	
参考文献	

分類 G-1-④

製剤名	止痒水L 読み しょうすい
規格・単位	500mL/本
効能・効果	肝炎患者の止痒
処方	①(局)95%エタノール 240ml ②(局)液状フェノール 3.5ml ③(局)ハッカ油 2.5ml ④(局)グリセリン 7.5ml 蒸留水 全量 500mL
必要な器具	
調製法	95%エタノール、液状フェノール、ハッカ油、グリセリンの順に加え、1つ入れるごとに良く攪拌する。 蒸留水で全量に合わせ、よく混合する。
調製上の注意点	
用法・用量 使用方法など	塗布
容器・貯法など	室温保存、褐色ポリ容器
有効期限	6ヶ月
使用診療科(主要)	
供給方法	オーダー(処置、処方)
製剤依頼書の有無	有
備考	
参考文献	