

メタボリックシンドローム

内臓脂肪型肥満に加えて、高血糖、高血圧、脂質異常のいずれか2つ以上合わせ持った状態を**メタボリックシンドローム**と言います

内臓脂肪型肥満をベースに高血糖、高血圧、脂質異常が複数重なることによって動脈硬化を引き起こします



食べ過ぎや運動不足など生活習慣を改善しましょう



動脈硬化は心臓病や脳卒中など命にかかわる危険性が急激に高まります



メタボリックシンドローム

内臓脂肪型肥満に加えて、高血糖、高血圧、脂質異常のいずれか2つ以上合わせ持った状態を**メタボリックシンドローム**と言います

内臓脂肪型肥満をベースに高血糖、高血圧、脂質異常が複数重なることによって動脈硬化を引き起こします



食べ過ぎや運動不足など生活習慣を改善しましょう



動脈硬化は心臓病や脳卒中など命にかかわる危険性が急激に高まります



メタボリックシンドローム

内臓脂肪型肥満に加えて、高血糖、高血圧、脂質異常のいずれか2つ以上合わせ持った状態を**メタボリックシンドローム**と言います

内臓脂肪型肥満をベースに高血糖、高血圧、脂質異常が複数重なることによって動脈硬化を引き起こします



食べ過ぎや運動不足など生活習慣を改善しましょう



動脈硬化は心臓病や脳卒中など命にかかわる危険性が急激に高まります



メタボリックシンドローム

内臓脂肪型肥満に加えて、高血糖、高血圧、脂質異常のいずれか2つ以上合わせ持った状態を**メタボリックシンドローム**と言います

内臓脂肪型肥満をベースに高血糖、高血圧、脂質異常が複数重なることによって動脈硬化を引き起こします



食べ過ぎや運動不足など生活習慣を改善しましょう



動脈硬化は心臓病や脳卒中など命にかかわる危険性が急激に高まります



メタボリックシンドローム

内臓脂肪型肥満に加えて、高血糖、高血圧、脂質異常のいずれか2つ以上合わせ持った状態を**メタボリックシンドローム**と言います

内臓脂肪型肥満をベースに高血糖、高血圧、脂質異常が複数重なることによって動脈硬化を引き起こします



食べ過ぎや運動不足など生活習慣を改善しましょう



動脈硬化は心臓病や脳卒中など命にかかわる危険性が急激に高まります



メタボリックシンドローム

内臓脂肪型肥満に加えて、高血糖、高血圧、脂質異常のいずれか2つ以上合わせ持った状態を**メタボリックシンドローム**と言います

内臓脂肪型肥満をベースに高血糖、高血圧、脂質異常が複数重なることによって動脈硬化を引き起こします



食べ過ぎや運動不足など生活習慣を改善しましょう



動脈硬化は心臓病や脳卒中など命にかかわる危険性が急激に高まります



メタボリックシンドローム

内臓脂肪型肥満に加えて、高血糖、高血圧、脂質異常のいずれか2つ以上合わせ持った状態を**メタボリックシンドローム**と言います

内臓脂肪型肥満をベースに高血糖、高血圧、脂質異常が複数重なることによって動脈硬化を引き起こします



食べ過ぎや運動不足など生活習慣を改善しましょう



動脈硬化は心臓病や脳卒中など命にかかわる危険性が急激に高まります



メタボリックシンドローム

内臓脂肪型肥満に加えて、高血糖、高血圧、脂質異常のいずれか2つ以上合わせ持った状態を**メタボリックシンドローム**と言います

内臓脂肪型肥満をベースに高血糖、高血圧、脂質異常が複数重なることによって動脈硬化を引き起こします



食べ過ぎや運動不足など生活習慣を改善しましょう



動脈硬化は心臓病や脳卒中など命にかかわる危険性が急激に高まります

